



**COMPOSICIÓN:**

Cada Cápsula Blanda contiene:

Ibuprofeno ..... 200mg

Cafeína Anhidra.....30mg

Excipientes c.s.

**INDICACIONES:** Tratamiento sintomático del dolor leve a moderado.

**POSOLOGÍA:** Adultos: 1 cápsula 3 a 4 veces al día, no exceder de 4 cápsulas en 24 horas (800mg de Ibuprofeno/día).

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía Oral

**ADVERTENCIAS:** Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2 a 3 días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Debe disminuirse el consumo de café y/o té con la administración de este producto. Este producto puede ocasionar dificultad para conciliar el sueño, intranquilidad e irritabilidad. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada.

**PRECAUCIONES:** Pacientes con antecedentes de úlcera gastrointestinal

**CONTRAINDICACIONES:** Alergia al Ibuprofeno, aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. Úlcera gastroduodenal activa. Pacientes con alteraciones de la coagulación. Pacientes con tratamiento anticoagulante. Pacientes con síntomas de Dengue.

**REACCIONES ADVERSAS:** Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, epigastralgia, indigestión, diarrea, dolor abdominal.

Cardíacas: Palpitaciones, taquicardia, alteraciones del ritmo.

Neurológicas: Cefalea, mareos, somnolencia, visión borrosa, insomnio, intranquilidad e irritabilidad.

Psicológicas: La ingesta prolongada de cafeína puede producir tolerancia, habituación y dependencia psicológica.

Dermatológicas: Erupción cutánea, edema.

Otras: Con dosis altas y durante tiempo prolongado se han informado casos de trastornos hematológicos, hepatotoxicidad, ulceración y hemorragia gastrointestinal, ambliopía tóxica, trastornos de la visión de colores, disminución de la audición y trastornos renales

**INTERACCIONES:** Ácido acetil salicílico y otros AINES, ciprofibrato, carbonato de litio, baclofén, teofilina.

Manténgase fuera del alcance de los niños a temperatura inferior a 30 °C.

Venta sin prescripción facultativa

Elaborado por: INDUSTRIAS INTERCAPS DE VENEZUELA C.A.

Para: LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICALS C.A., **Calle Altagracia, Edificio P&G, Piso 5, Urb. Sorocaima, Mpio. Baruta, Edo. Miranda, Venezuela. RIF J-30010036-7.**